



ІНСУЛЬТ



ЧМТ



НЕЙРОКОГНІТИВНІ
ПОРУШЕННЯ

Церебролізин® — найкращий лікарський засіб для відновлення після інсульту!

Підтверджено багатьма рекомендаціями



Церебролізин®

Воз'єднує нейрони.
Надихає на життя.

Австрійська
якість.

Церебролізин® – ефективний препарат для відновлення після інсульту!

Церебролізин®

включений до **рекомендацій** з реабілітації після інсульту найкращих референтних країн



Найкращий лікарський засіб для реабілітації після інсульту!



Найвищий рівень доказовості щодо покращення **рухових функцій, активності в повсякденному житті та якості ЖИТТЯ**



Початок лікування в **гострій стадії, 30 мл протягом 21 дня**



Факти про реабілітацію після **інсульту**

15 мільйонів людей

щороку переносять інсульт

Інсульт є однією з **головних причин** серйозної, **довготривалої інвалідності** в усьому світі

5 мільйонів людей

щороку зазнають постійних втрат працездатності через інсульт

80% із них мають **геміпарез верхньої кінцівки**

Значно зростає кількість досліджень з нейрореабілітації

Високе значення **рекомендацій з реабілітації після інсульту**

у багатьох країнах

Церебролізин® включений до рекомендацій з реабілітації після інсульту найкращих референтних країн



АВСТРІЯ



КАНАДА



НІМЕЧЧИНА



- Різні комітети з розробки рекомендацій
- Різні моменти часу
- Абсолютно по-різному складені

Усі дійшли одного висновку:

Церебролізин® — найкращий лікарський засіб для реабілітації після інсульту!

Найкращий лікарський засіб

для реабілітації після інсульту!

Високий рівень доказовості в усіх рекомендаціях

Австрія



**Церебролізін® –
лікарський засіб
з найкращою
оцінкою**

- Перші Австрійські рекомендації з реабілітації після інсульту, що ґрунтуються на доказовій базі
- **Церебролізін® – єдиний офіційно згаданий препарат**

Канада



Церебролізін® –
Єдиний препарат,
який рекомендований
на 100 %*

- Єдиний позитивний **1A рівень** стосовно відновлення рухової функції
- Самий високий ступінь рекомендацій щодо покращення активності в повсякденному житті

Німеччина



Церебролізін®
отримав найвищу
оцінку серед
лікарських засобів

- Концепція лікування під час **дослідження CARS** підтвердилася!
- Відновлення функції верхніх кінцівок має вагомий вплив на якість життя та активність у повсякденному житті

Найвищий рівень доказовості щодо покращення рухових функцій, активності в повсякденному житті та якості життя

Рекомендації підтвердили результати досліджень Церебrolізину

Домен	Рухова функція 	Активність у повсякденному житті 	Якість життя 
Результати досліджень Церебrolізину	Відновлення рухової функції	Покращення активності в повсякденному житті	Поліпшення якості життя
Церебrolізин® рекомендований			

Початок лікування в гострій стадії, 30 мл протягом 21 дня

Рекомендується концепція лікування під час дослідження CARS



Церебролізін®



Лікування:
30 мл протягом 21 дня



Фізична терапія:
активні та пасивні рухи, масаж



Фізична терапія:
активні рухи

Посилання:

1. Hillis et al. Відновлення після інсульту: дивовижні впливи та залишкові наслідки. *Advances in medicine*. 2014.
2. Hatem et al. Реабілітація рухової функції після інсульту: множинний систематичний огляд, присвячений методам стимуляції відновлення верхньої кінцівки. *Frontiers in human neuroscience*. 2016; 10: 442.
3. Austrian Guideline: https://www.xn--gsf-rna.at/wp-content/uploads/2016/11/Positionspapier-2018_OEGSF_neurologisch.pdf
4. Canadian Guideline: http://www.ebrsr.com/sites/default/files/EBRSR%20Handbook%20Chapter%204_Upper%20Extremity%20Post%20Stroke_ML.pdf
5. DGNR Guideline: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/080-001.html>

Церебролізін® (CEREBROLYSIN®). Психостимулюючі та ноотропні препарати. Код АТХ N06BX. Розчин для ін'єкцій. 1 мл розчину містить 215,2 мг концентрату Церебролізіну (пептидного препарату, що виробляється з мозку свиней). **Показання:** органічні, метаболічні порушення та нейродегенеративні захворювання головного мозку, насамперед хвороба Альцгеймера; ускладнення після інсульту; травматичні пошкодження головного мозку (стани після оперативного втручання на мозку, закриті черепно-мозкові травми, струс мозку). **Протипоказання:** підвищена чутливість до одного з компонентів препарату, епілепсія, тяжкі порушення функції нирок. **Побічні реакції.** Побічні реакції в зв'язку з терапією препаратом Церебролізін® відмічаються рідко (> 1/10000 – < 1/1000) або мають поодинокі випадки (< 1/10000). При дуже швидкому введенні можливі запаморочення, тремор, головний біль, відчуття жару, посилене потовиділення, свербіж, можливі макулопапульозні висипання, кропив'янка, почервоніння шкіри, задишка та біль у грудях. **Фармакологічні властивості.** Церебролізін® стимулює диференціацію клітин і активує механізми захисту та відновлення, безпосередньо впливає на нейрональну і синаптичну пластичність, що сприяє поліпшенню когнітивних та рухових функцій. **Спосіб застосування та дози.** Препарат вводять внутрішньовенно або внутрішньом'язово. Тривалість курсу лікування та оптимальна щоденна доза залежать від стану хворого, патології, яку він має, та його віку. Частіше рекомендована тривалість курсу лікування становить 10–20 днів. Ефективність терапії зазвичай зростає при проведенні повторних курсів. Лікування продовжують доти, доки спостерігається поліпшення стану пацієнта внаслідок терапії. **Категорія відпуску.** За рецептом. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. **Інформація для фахівців у галузі охорони здоров'я.** Рп. МОЗ України: № UA/9989/01/01, дійсне від 21.03.2019.

www.cerebrolysin.com.ua